일반의약품

약효분류 : 222 진해거담제

083117

가래녹임 · 기도 청정제

뮤코졸정

Mucosol tablet
(브롬헥신염산염)

· 이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관 하시기 바랍니다.

· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

뮤코졸의 성분인 브롬헥신염산염은 오래전부터 인도의 민간에서 기침 가래약으로 사용해 오던 인도생약(Adhatoda vasica)의 주성분인 vasicine을 기본으로 하여 인공적으로 합성한 유도체입니다. 기관지나 폐포의 염증으로 인해 가래가 점조해진(끈끈하고 뻑뻑해진) 경우에 뮤코졸은 가래를 묽게하여 쉽게 배출되게 하여 기침을 멎게 합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
유효성분 : 브롬헥신염산염(BP) ····· 8.0mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 젖), 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)
첨가제(타르색소) : 황색 4호
기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 탤크

【성상】 황색 정제임

【약리작용】 브롬헥신은 기관지의 분비상태를 변화시켜 기관지 분비를 증가시킴으로서 기관지 분비물의 점도를 저하시켜서 객담(가래)의 배출을 쉽게 합니다. 또한 기도점액을 녹이는 작용이 있어 기도를 청정화시킵니다.

【효능 · 효과】 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염

【용법 · 용량】 성인 및 14세 이상 : 브롬헥신염산염으로서 1회 8~16mg을 1일 3회 복용한다. 6세 이상 14세 미만 소아 : 이 약으로서 1회 4~8mg을 1일 2~3회 복용한다. 2세 이상 6세 미만의 소아 : 이 약으로서 1회 4mg을 1일 1~2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.** / 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자 2) 수유부 : 이 약 및 이 약의 대사체가 인간의 모유로 이행되는지에 대해서 알려지지 않았다. 동물에서의 약물 약력학/독성학 자료에서는 이 약 및 이 약의 대사체가 동물의 모유로 분비되는 것으로 나타났다. 모유를 먹는 영아에 대한 위험이 배재될 수 없으므로 수유부에게 이 약은 투여되어서는 안 된다. 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. **다음 환자에는 신중히 투여할 것.** / 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. **다음과 같은 사람은 이약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.** / 1) 위궤양 환자 2) 심한 신장애 환자 3) 간부전 또는 심한 간질환 환자(예, 감량하거나 투여 간격을 늘리는 등 주의 깊은 모니터링이 필요하다). 4) 기관지운동 부전 및 다량 분비물이 있는 환자(분비물 축적이 촉진될 위험이 있다). 5) 임부 : 이 약을 임부에게 투여한 자료는 제한적이다. 동물실험에서 직접 또는 간접적인 생식독성이 관찰되지 않았다. 따라서 예방적인 조치로 이 약을 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여가 권장되지 않는다(특히, 임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다). 6) 에리트로마이신, 세팔렉신, 세푸록심, 아목시실린, 독시사이클린, 옥시테트라사이클린 등의 항생물질을 복용하는 환자 : 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증가시킬 수 있다. 7) 고령자 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
4. **다음과 같을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.** / 1) 위장관계 : 설사, 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 상복부통증 등 2) 정신신경계 : 때때로 두통 3) 면역계, 피부 및 피하조직, 호흡기계, 흉부, 종격동 : 발진, 호흡곤란, 일시적 오한 등이 나타날 경우, 알레르기 반응으로 두드러기, 기관지경련, 혈관부종, 가려움, 아나필락시스 쇼크를 포함한 아나필락시스 반응 및 다른 과민반응이 나타나는 경우 4) 복용 5일 후 증상이 개선되지 않는 경우
5. **기타 이 약을 복용시 주의할 사항** / 1) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사용해(리엘증후군)와 같은 중증의 피부 장애가 보고되어 왔는데, 이 약과 같은 거담제 투여와 관련해서 매우 소수에서 보고되었고, 대부분은 환자의 기저질환 및/또는 병용약물에서 기인하는 것으로 보인다. 또한, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사용해(리엘증후군)의 초기 단계에, 환자는 비특이적 인플루엔자 유사증상(예를 들어, 발열, 몸살, 비염, 기침 및 인후염)을 경험할 수 있다. 이러한 초기증상 때문에 기침 및 감기약으로 대증적 치료를 시작할 가능성이 있다. 그러므로 이 약 투여중 새로운 피부/점막 장애가 나타나면 즉시 의사의 진찰을 받고, 이 약 투여를 중단해야 한다. 2) 이 약으로 치료 받는 동안 객담량의 증가가 나타날 수 있음을 환자에게 알려주어야 한다. 3) 급성 호흡기 질환 치료시, 증상이 개선되지 않거나 악화된다면 의사의 진찰을 받아야 한다. 4) 운전 및 기계조작 능력의 영향에 대해 수행된 시험은 없다. 5) 기타 - (1) 드물게 혈담이 나타날 수 있다. (2) 동물실험에서 장기간 다량을 연속 투여할 경우 혈청중에 아미노전달효소치와 객담량이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다. (3) 객담량의 일시적 증가는 환자가 불안감을 호소할 수 있다. 6) 과량투여로 인한 특이한 증상은 보고되지 않았으나, 발생시 적절한 처치를 한다. 우발적인 과량투여나 약물 복용 실수 보고에 의하면, 관찰된 증상은 이 약의 권장량에서 발생한 이상 반응과 일치하며 대증치료를 요할 수 있다. 7) 사람의 생식능에 대하여 수행된 시험은 없다. 동물실험에서 수태능에 대한 영향은 없었다.
6. **저장상의 주의사항** / 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 30, 500, 1000정/병

【저장방법】 차광한 기밀용기

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(http://www.drugsafe.or.kr → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.
※ 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의약품 정보 참조
※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조 · 판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 http://www.bukwang.co.kr

※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 08월 31일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.